

術式 ソケイヘルニア根治術

様 才 主治医

入院診療計画書

担当看護師

診断名( )

0

日付	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	<b>手術前日</b>	<b>手術</b>		<b>術後1日目</b>	<b>2日目</b>	<b>3日目</b>
		術前	術後			
患者状態	術前処置の必要性が理解できる	術前処置の必要性が理解できる	痛みがコントロールできる	排ガスがある	排ガスがある	パッキングが除去できる
	術後の安静の必要性が理解できる	術後の状態をイメージできる	血圧が安定している	排尿障害がない	頭痛がない	排便がある
			食事が摂取できる	頭痛がない		
生活動作				トイレ歩行できる	歩行が自由にできる	
説明・指導	手術の必要性が理解できる					退院指導が理解できる
循環			定期的に血圧等測定します			
注射薬	抗生剤の皮内反応テストをします	手術の前に点滴があります	手術後点滴があります	点滴1本 抗生剤の点滴が1日2回あります	点滴1本	
栄養	常食 絶飲食(21時以降)		3分(夕より) (OP後2時間より許可)	常食		
内服	21時に下剤を飲みます		夕食後から痛み止めの薬を飲んでください			
検査	採血 胸・腹レントゲン 心電図検査があります			血液検査があります		
処置・他	手術する部位の毛を剃ります、その後入浴してください	朝、浣腸をします				
疼痛・創管理						パッキング除去
排泄			手術中に尿を出す管を入れます	尿の管を抜きます		
清潔	入浴			自分で歯磨きしましょう 看護師が身体を拭きます	拭ける部分は自分で拭きましょう	
活動			ベッド上安静	廻診後歩行出来ます		
指導	入院時オリエンテーション(看護師)		手術後説明(医師)			退院説明(医師により)7日目入浴可 再診は2~3日後(3Mテープは再診時に除去)
	CPオリエンテーション					退院療養計画書
	入院診療計画書					
	術前説明(医師)					

\* 計画書通りに行かない事もあります。